

# Informativo Epidemiológico

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - HRMS


JUNHO | 2016




## PRECAUÇÃO PADRÃO

Deve ser aplicada durante a assistência a todos os pacientes, adotando o uso de alguns equipamentos de proteção ao realizar qualquer procedimento que ofereça risco potencial de contaminação com fluidos corporais, utilizando sempre a prática de higienização das mãos.

• Sequência de COLOCAÇÃO de EPI.



• Sequência de RETIRADA de EPI.



## PRECAUÇÕES PARA GOTÍCULAS




HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



MÁSCARA CIRÚRGICA (PROFISSIONAL)



MÁSCARA CIRÚRGICA (PACIENTE DURANTE O TRANSPORTE)



QUARTO PRIVATIVO



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



MÁSCARA PFF2 (N-95) (PROFISSIONAL)



MÁSCARA CIRÚRGICA (PACIENTE DURANTE O TRANSPORTE)



QUARTO PRIVATIVO

## PRECAUÇÕES DE CONTATO




HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



AVENTAL



LUVAS



QUARTO PRIVATIVO

INFECÇÃO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	SESAU
Coqueluche	Gotículas	Terapêutica eficaz até 07 dias
Diarreia	Contato	Durante a doença
Influenza (SRAG) - Adultos	AEROSSÓIS (se estiver inalando, nebulizando ou durante intubação orotraqueal)	Até 07 dias ou por 24 horas após o desaparecimento da febre e sintomas respiratórios
Influenza (SRAG) - Crianças e imunodeprimidos	GOTÍCULAS (se manter distância menor de 1 metro)	Até 07 dias ou por 24 horas após o desaparecimento da febre e sintomas respiratórios
Meningite <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> e Meningococcemia	Gotículas	Até 24 horas após início de terapêutica eficaz
Rotavírus	Contato	Durante a doença
Rubéola	Contato + Gotículas	Até 07 dias após início do exantema
Sarampo	Aerossóis	Até 04 dias após início do exantema
Tuberculose Pulmonar	Aerossóis	Até 02 baciloscopias negativas
Varicela/Herpes Zoster - Imunossuprimidos	Contato + Aerossóis	Até todas as lesões tornarem-se crostas
Varicela/Herpes Zoster - Imunocompetentes	Padrão	Sem necessidade

## PROFISSIONAIS DA SAÚDE



VÁRIAS SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO: paciente com tosse, espirro, secreções nasais, lesões de pele, mãos contaminadas do paciente e dos profissionais de saúde, reencape de agulha, etc.



## COMO VOCÊS PODEM SE PROTEGER DOS AGENTES BIOLÓGICOS TRANSMISSÍVEIS

### SEMPRE

- Higienizar as mãos antes e depois de utilizar o banheiro e realizar as refeições.
- Higienizar as mãos nos 5 momentos: 1. Antes de contato com o paciente; 2. Antes da realização de procedimento asséptico; 3. Após risco de exposição a fluidos corporais; 4. Após contato com o paciente e 5. Após contato com as áreas próximas ao paciente.
- Mantervacinação do profissional de saúde em dia para hepatite B, gripe, dupla tetânica e tríplice viral e os imunobiológicos específicos para a função. Orientação quanto a imunização ocupacional específica para função disponível no ícone do Núcleo de Vigilância Hospitalar.
- Utilizar o tipo de precaução e EPIs de acordo com a suspeita ou diagnóstico da doença infecciosa transmissível do paciente disponíveis no verso.
- Utilizar lenço descartável para higiene das narinas quando presentes sintomas respiratórios – coriza, tosse e espirros.
- Cobrir o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Tosse com etiqueta.
- Procurar o SERVIÇO DE ENFERMAGEM E MEDICINA DO TRABALHO quando apresentar tosse por mais de 02 semanas, lesões bolhosas na pele, sintomas respiratórios agudos menores de 07 dias acompanhados de febre, entre outros.
- Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, atividade física e ingestão de líquidos.

### NUNCA

Reencape agulhas.