

Informativo Epidemiológico

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - HRMS

DEZEMBRO | 2016



CHIKUNGUNYA: 70% DOS CASOS INFECTADOS ADOECEM E A MAIORIA EVOLUI PARA A FORMA CRÔNICA.



Embora o zika vírus tenha “roubado a cena”, na atualidade a febre de chikungunya está avançando em todas as regiões país, com exceção o estado do Rio Grande do Sul, que é o único sem registro de casos autóctones. Dados esses registrados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) após o preenchimento da Ficha de Investigação Epidemiológica, disponível na pasta pública/ NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA HRMS/ FICHAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS AGRAVOS DOENÇAS/DENGUE CHIKUNGUNYA 2016, diante do caso suspeito, conforme conceitos a seguir:

CASO SUSPEITO DE DENGUE: pessoa que viva ou tenha

viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de *Ae.aegypti*, que apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresente duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, cefaleia, dor retroorbital, petéquias ou prova do laço positiva e leucopenia.

CASO SUSPEITO DE CHIKUNGUNYA: febre de início súbito e artralgia ou artrite intensa com início agudo, não explicado por outras condições, que resida ou tenha viajado para áreas endêmicas ou epidêmicas até 14 dias antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com um caso importado confirmado.

FASES DE MANIFESTAÇÃO CLÍNICA DO CHIKUNGUNYA

PERÍODO DE INCUBAÇÃO	MANIFESTAÇÕES	FASE AGUDA (DURAÇÃO 14 DIAS)	FASE SUBAGUDA (14 A 3 MESES)	FASE CRÔNICA >3MESES
3-7 dias (médio 1 a 12 dias)	Típicas A duração dos sintomas é, em média, de 7 dias	<ul style="list-style-type: none"> > 70% dos casos adoecem Temp. Ax. >39°C Poliartralgias intensas (simétricas bilateral, podendo ser assimétrica, geralmente aumentado nas articulações distais) com ou sem edema Dorsalgia Cefaleia Mialgia Vômitos Náuseas Fadiga Exantema maculo ou maculopapular (2º ou 5º dia) 	<ul style="list-style-type: none"> Poliartrite distal Tenossinosite hipertrófica Fadiga Síndrome de Raynaud Fraqueza intensa 	SINTOMAS VARIAM COM O SEXO E A IDADE MULHERES  <ul style="list-style-type: none"> Exantema, vômitos, sangramento e úlceras orais IDOSOS  <ul style="list-style-type: none"> Artralgia, Coceira e > duração da febre, artropatias destrutivas podem acontecer
	Atípicas (CASOS GRAVES)	<ul style="list-style-type: none"> Meningoencefalites Síndrome de Guillain-Barré Encefalites Paresias, paralisias e neuropatias. 		
EXAMES LABORATORIAIS	<ul style="list-style-type: none"> MVPEP: Hemograma, Bioquímica (TGO/TGP/ Na/ K/ Uréia e creatinina); Requisição do Lacen: deve ser preenchida com solicitação para dengue e chikungunya conforme orientações abaixo: PCR ou isolamento Viral (Soro/ urina/ liquor): 1º ao 8º dia início sintomas, Sensibilidade maior até o 5º dia de sintomas; Elisa/ Sorologia: IgM a partir do 5º dia do início dos sintomas; IgG a partir do 6º dia do início dos sintomas. 		Na requisição Lacen - Sorologia pareada: <ul style="list-style-type: none"> 1ª amostra na fase aguda; 2ª amostra 15 dias após a coleta da primeira amostra. 	

MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA DOR EM PACIENTES COM CHIKUNGUNYA

MEDICAÇÃO	POSOLOGIA		TOTAL
PARACETAMOL dose máxima diária de 4g/dia Apres: cp 500 cp 750mg sol 200mg/ml 1 ml=15 gts=200mg 1 gta=13mg	Adultos 500mg de 6/6h ou de 4/4h Ou 750mg de 6/6h ou 8/8h		Não usar em menores de 12 anos
	Idade 0 a 29 dias	Dose 10 a 15mg/kg a cada 6-8h	Dose máxima 8 cp/dia
	Idade 30 dias a 3 meses	10mg/kg a cada 6-8h	Dose máxima 5 cp /dia
	Idade 3 meses e 12 meses e de 1 a 12 anos	Dose 10 a 15mg/kg a cada 6-8h	Dose máxima = 275 gotas/dia
DIPIRONA Apres: Cp 500mg Cp 1 g Sol 500mg/ml 1 ml= 20gts= 500mg 1 gta=25mg	Adultos e > 15 anos	500mg VO 6/6h Ou 1 g VO 6/6h Ou 40 gts 6/6h	Crianças < 3 m ou < 5 kg não devem ser tratadas com dipirona
	< 15 anos	Consultar bula para dose adequada ao peso indicada pelo fabricante	
CODEÍNA Adultos Apres: cp 30mg Sol oral 3mg/ml	Adultos	30mg (de 15 a 60 mg) 4/4 ou 6/6h	Dose máxima diária de 360mg Indicado para dores refratárias ao paracetamol e dipirona
	>1 ano	0,5mg mg/kg/peso ou 15mg/m ² de superfície corporal 4/4 ou 6/6h	Não recomendado para crianças prematuras ou recém-natas. Dose máxima diária da solução é de 60mg/dia
TRAMADOL Apresentação: cp 50 a 100mg Sol 1 ml=40 gts=100mg	Adultos e > 14 anos	1 cp de 50 mg ou 20 gts 4/4 ou 6/6h	Contra indicado até os 14 anos Dose máxima 400mg/dia = 8cp de 50mg/dia= 160gts/dia Em virtude das náuseas associadas à medicação, deve-se administrar bromoprida 10mg

NOTA: Período de viremia 2 dias antes do início dos sintomas e pode durar 8 dias. CASOS GRAVES e ÓBITOS ocorrem com maior frequência em pacientes com comorbidades e externos de idade. / Mães que adquirem chikungunya no período intraparto podem transmitir o vírus para o recém-nascido por via placentária, transmissão perinatal. A taxa de transmissão, neste período, pode chegar por volta de 50%, desses, cerca de 90% podem evoluir para as formas graves. Não há evidência de que a cesariana altere o risco de transmissão. / Risco para a cronificação são: idade acima de 45 anos mais acentuada nas mulheres. O sintoma mais comum nesta fase crônica é o acometimento articular persistente ou recidivante nas mesmas articulações atingidas durante a aguda, caracterizado por dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade e ausência de eritema.

ATENÇÃO!

ÓBITO POR SUSPEITA DE DENGUE/ CHIKUNGUNYA/ ZIKA

NOTIFICAR IMEDIATAMENTE O NVEH (2584/2666) EM HORÁRIO COMERCIAL E NOS DEMAIS COMUNICAR À URR - FONE: 067991823031 E VIA WHATSAPP PELO GRUPO NOTIFICAÇÃO HRMS.

Excepcionalmente no mês de dezembro, os dados epidemiológicos estarão disponíveis no 2º Boletim Epidemiológico 2016.

FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção Básica Chikungunya: Manejo Clínico/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção Básica. - Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Elaborado Por: Dra. Mara Luci Galiz Lacerda e Revisado por: Enfa. Suse Barbosa Castilho