

---

## RECOMENDAÇÃO DE TRANSPORTE COVID-19

---

**Objetivo:** reforçar cuidados a serem realizados durante a realização do transporte intrahospitalar do paciente suspeito ou confirmado de COVID – 19.

---

### TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DO PACIENTE

---

- Limite o transporte ao estritamente necessário;
- Deverá seguir o fluxo do elevador, utilizando o **elevador maca 03**;
- Notificar o setor que irá receber o paciente e o ascensorista (caso disponível) que o paciente está em precaução (contato e gotículas);
- Durante o transporte o paciente deve utilizar máscara cirúrgica se em respiração espontânea (o transporte será realizado por técnico de enfermagem se paciente em enfermaria e estável e por equipe composta por 1 médico, 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem se paciente grave);
- Para pacientes em ventilação mecânica (o transporte será realizado por 1 médico, 1 enfermeiro e 1 técnico de enfermagem. Eventualmente com a presença do fisioterapeuta);
- Montar ventilador de transporte (enfermeiro do setor providencia equipamento, cilindro de oxigênio, circuito para o ventilador mecânico, filtro HEPA e pinça para clampar TOT, fisioterapeuta monta o ventilador e faz teste);
- Técnico de enfermagem separa as drogas necessárias para o transporte;
- Colocação da prancha de suporte para ventilador de transporte/ medicações na maleta de transporte (se disponível);
- Enfermeiro separa prontuário e coloca em saco plástico (quando necessário), providencia maleta de emergência e oxímetro de pulso (isolar do leito com colocação de avental descartável);
- Os setores com características específicas como unidades pediátricas poderão fazer inclusões ou alteração que contemplem a especificidade do serviço;
- TODOS os profissionais que participam do transporte do paciente devem utilizar equipamentos de proteção (máscara N95, óculos, avental descartável, dois pares de luvas e gorro).

---

## IMEDIATAMENTE ANTES DO TRANSPORTE

---

### Comunicar setor que receberá paciente com suspeita de COVID

Os profissionais que tiveram contato com o paciente e que irão participar do transporte deverão:

- RETIRAR 1º par de luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos;
- RETIRAR avental descartável com 2º par de luvas;
- Higienizar as mãos;
- Vestir NOVO avental descartável e PERMANECER com máscara N95, gorro e óculos de proteção;
- Higienizar as mãos;
- Calçar 2 NOVOS pares de luvas de procedimento;
- Prosseguir para transporte do paciente.

#### ATENÇÃO:

Destacar um profissional APENAS para tocar superfícies, como maçanetas, elevador etc e sinalizar evacuação para possíveis pessoas que possam estar no percurso.

Durante o transporte deve ser utilizado avental descartável e luvas de procedimento LIMPOS (se profissional em uso de avental impermeável/macacão por todo período, usar avental descartável (TNT) por cima e fazer a troca apenas deste e das luvas).

---

## APÓS TRANSPORTE

---

### Antes de sair do quarto, ainda paramentado

- Retirar 1º par de luvas de procedimento.

### Ao sair do quarto

- Higienizar as mãos;
- Calçar novo par de luvas;
- Realizar limpeza e desinfecção de maca e equipamentos;
- Retirar 1º par de luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos;
- Retirar avental descartável com 2º par de luvas;
- Higienizar as mãos;
- Retirar gorro;
- Retirar óculos de proteção;
- Retirar máscara N95;
- Higienizar as mãos.

**OBS: Comunicar PRIME para higienização do elevador.**

## TRANSPORTE DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID19 NO HRMS

### IMEDIATAMENTE ANTES DO TRANSPORTE:

**Comunicar setor que receberá paciente  
com  
Suspeita de COVID**

Os profissionais que tiveram contato com o paciente e que irão participar do transporte deverão:

- RETIRAR 1º par de luvas de procedimento
- Higienizar as mãos
- RETIRAR avental descartável com 2º par de luvas
- Higienizar as mãos
- Vestir NOVO avental descartável e PERMANECER com máscara N95, gorro e óculos de proteção
- Higienizar as mãos
- Calçar 2 NOVOS pares de luvas de procedimento
- Prosseguir para transporte do paciente

### APÓS TRANSPORTE:

#### Antes de sair do quarto, ainda paramentado

- Retirar 1º par de luvas de procedimento
- Ao retornar ao setor de origem
- Higienizar as mãos
- Calçar novo par de luvas
- Realizar limpeza e desinfecção de maca e demais equipamentos
- Retirar 1º par de luvas de procedimento
- Higienizar as mãos
- Retirar avental descartável com 2º par de luvas
- Higienizar as mãos
- Retirar gorro
- Retirar óculos de proteção
- Retirar máscara N95
- Higienizar as mãos

**Comunicar PRIME para higienização do elevador**

### ATENÇÃO

Destacar um profissional APENAS para tocar superfícies, como maçanetas, elevador etc) durante o transporte

EPIs necessários para transporte do paciente com suspeita de COVID 19

**AVENTAL DE PROCEDIMENTO, MÁSCARA N95,  
2 PARES DE LUVAS, ÓCULOS**

**DURANTE O TRANSPORTE DEVEM SER UTILIZADOS AVENTAL DESCARTÁVEL E 2 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LIMPOS**