

Diretoria:	Diretoria de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional	Data da Emissão:	05/09/2024
Área:	Serviço de Cuidados com a Pele	Versão nº.:	1.0.0
Código:	PTC.DEPQI-SCP.002	Próxima Revisão:	SET/2026

COBERTURAS PARA CURATIVOS

SIGLAS, ABREVIATURAS E SIMBOLOS

- a) % – Porcentagem;
- b) cm – centímetro;
- c) FR – frasco;
- d) g – grama;
- e) h – horas;
- f) HRMS – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul;
- g) LP – Lesão por Pressão;
- h) min – mínimo;
- i) ml – mililitro;
- j) MMII – Membros inferiores;
- k) pH – potencial Hidrogeniônico;
- l) PHMB – Soluções de Polihexametileno de Biguanida;

OBJETIVOS

Geral:

- a) Apresentar a equipe assistencial as coberturas padronizadas no HRMS para realização de curativos aos pacientes durante internação hospitalar.

Específicos:

- a) Orientar a equipe assistencial quando a ação, indicação e contraindicação de cada cobertura e sua frequência de trocas.

UTILIZADORES POTENCIAIS

- a) Serviço de Cuidados com a Pele;
- b) Médicos;
- c) Enfermeiros;
- d) Técnicos;
- e) Auxiliares de enfermagem.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Aplicável a todos os pacientes internados no HRMS que possuem feridas/lesões.

COBERTURAS PADRONIZADAS

Na tabela 1 são apresentadas as coberturas padronizadas no HRMS para realização de curativos.

Tabela 1: Coberturas padronizados no HRMS

Cobertura	Código	Descritivo MV
Hidrogel com PHMB	106544	CURATIVO HIDROGEL COM PHMB (POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA)
Alginato de cálcio	98643	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10X10CM
Alginato de cálcio com prata	106737	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO(CMC) E PRATA 10X10CM
Filme transparente de poliuretano (em rolo não estéril)	98311	CURATIVO FILME POLIURETANO TRANSPAREN. NAO ESTERIL 10CMX10MT
Gaze não aderente impregnada de petrolatum	105361	CURATIVO PRIMARIO, COMPRESSA EMULSÃO DE PETROLATUM
Espuma de poliuretano com prata 10x10	98645	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 10X10CM
Espuma de poliuretano com prata 15x15	90004969	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 15X15CM
Bota unna - bandagem de gaze com óxido de zinco	105359	CURATIVO BANGAGEM ELASTICA DE GAZE, TIPO BOTA DE UNNA, OXIDO
Gaze não aderente com age	105370	CURATIVO PRIMARIO, GAZE COM AGE, NÃO ADERENTE 7,5X7,5CM
Solução polimérica - película protetora de pele spray	93504	CURATIVO SOLUCAO POLIMERICA SPRAY
Adesivo de silicone composto com espuma – 10x10	107048	CURATIVO AUTO ADESIVO DE SILICONE COMPOSTO ESPUMA 10X10CM
Adesivo de silicone composto com espuma – 15x15	107047	CURATIVO AUTO ADESIVO ESPUMA DE SILICONE COMPOSTO 15X15CM
Papaína gel 10%	2131	PAPAINA 10% GEL BISNAGA 100G
Papaína creme 10%	66119	PAPAINA 10% , CREME, POTE COM 100G
Colagenase	65804	COLAGENASE 0,6UI/G , POMADA , BISNAGA COM 30G
Sulfadiazina de prata	66155	SULFADIAZINA DE PRATA 1%, CREME, BISNAGA C/ MIN 30G
Sulfato de neomicina	66002	NEOMICINA+BACITRACINA(5MG+250UI)/G CREME BISNAGA COM 10G
Mupirocina	79054	MUPIROCINA 20MG/G, POMADA, BISNAGA COM 15G
Ácido caprílico	65608	ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO + ASSOC, FR C/ 200ML
Carvão ativado com prata	98647	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA 10,5X10,5CM
Metronidazol	85529	METRONIDAZOL 100MG/G, GELEIA GINECOLOGICA 50G
Creme barreira	105362	CURATIVO CREME BARREIRA RESTAURAD./ESTABILIZADOR PH PELE 60G
Hidrocolóide 10x10	98639	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM
Hidrocolóide 15x15	1993	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15CM
Hidrocolóide 15x20	98641	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X20CM
Hidrocolóide 20x20	98640	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20CM
Polihexanida solução aquosa – PHMB solução	105372	CURATIVO SOLUÇÃO AQUOSA PHMB P/ REMOÇÃO DE BIOFILME FR 350ML

COBERTURAS

HIDROGEL COM PHMB

Tabela 2: Hidrogel com PHMB

Ação	Manter equilibrada a umidade do leito da ferida, com ação antimicrobiana. Promover debridamento autolítico e estimular cicatrização.
Indicação	• Remoção de crostas e tecidos desvitalizados de feridas abertas. • Controle da carga bacteriana.
Contraindicação	Pele íntegra, ferida operatória fechada e feridas muito exsudativas.
Frequência de troca	• A cada 24h. • Requer um curativo secundário e deve-se observar proteção nos bordos da ferida, evitando a maceração (excesso de umidade nas bordas da ferida). • Trocar cobertura secundária a cada 12h ao menos.

ALGINATO DE CÁLCIO

Tabela 3: Alginato de cálcio

Ação	Auxilia no desbridamento autolítico, alta capacidade de absorção, forma um gel mantendo o meio úmido e induz a hemostasia
Indicação	• Feridas abertas, sangrantes, exsudação moderada a altamente exsudativas. • Para lesões com presença de infecção utilizar ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA. • Feridas profundas: ocupar os espaços mortos, tunelização na ferida.
Contraindicação	Feridas superficiais, feridas pouco exsudativas e feridas secas.
Frequência de troca	• A cada 72 horas; • Trocar cobertura secundária de 12/12horas ou conforme saturação.

FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO (EM ROLO NÃO ESTÉRIL)

Tabela 4: Filme transparente de poliuretano (em rolo não estéril)

Ação	Promovem a autólise do tecido necrótico ao manter um ambiente úmido. Possuem permeabilidade seletiva, permitindo a difusão de gases e a evaporação do excesso de exsudato, prevenindo assim a maceração da pele. São impermeáveis a fluidos e microrganismos, atuando como uma barreira mecânica, além de possibilitar a visualização da lesão.
Indicação	• Proteção de proeminências ósseas; • Cobertura secundária; • Fixação de curativos.
Contraindicação	Aplicação direta em feridas abertas e feridas muito exsudativas.
Frequência de troca	• Como fixação de curativos conforme a troca da cobertura primária, podendo permanecer até 72hs. • Como proteção de proeminências ósseas a cada 5 a 7 dias.

GAZE NÃO ADERENTE IMPREGNADA DE PETROLATUM

Tabela 5: Gaze não aderente impregnada de petrolatum

Ação	Mantém o meio úmido ideal para cicatrização. • Protege a ferida e tecidos nobres (ossos e tendões); • Preserva o tecido de granulação e evita aderência ao leito da ferida permitindo retirada sem dor e com proteção do tecido viável; • Permite passagem do exsudato para curativo secundário.
Indicação	• Áreas doadoras e receptoras; • Exposição de ossos e tendões; • Lesões não infectadas, com pouca ou sem exsudação. • Necessita de cobertura secundária (gaze estéril ou compressa).
Contraindicação	Feridas com secreção purulenta.
Frequência de troca	• A cada 48h/72h; • Utilizando outra cobertura secundária de 12/12h ou conforme saturação.

ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA

Tabela 6: Espuma de poliuretano com prata

Ação	Ação antibacteriana. A concentração de íons de prata é liberada e forma um gel que auxilia na formação do tecido de granulação e na epitelização
Indicação	• Feridas saturadas (molhadas e/ou encharcadas); • Queimaduras de I e II grau; • Úlceras de pernas; • Lesão por pressão com exsudação moderada a alta.
Contraindicação	Feridas secas, com tecido necrótico e pacientes com históricos de sensibilidade a prata
Frequência de troca	• Dependendo do estado da ferida, período máximo de troca de 7 dias; • Cobertura secundária de 12/12h ou conforme saturação.

BOTA UNNA - BANDAGEM DE GAZE COM ÓXIDO DE ZINCO

Tabela 7: Bota unna - bandagem de gaze com óxido de zinco

Ação	Por ser uma atadura de algodão impregnada com pasta de óxido de zinco micronizado, óleo de rícino, goma acácia, glicerina e petrolatum, ajuda a manter a hidratação da pele e ferida auxiliando assim cicatrização da ferida, não adere ao leito.
Indicação	• Úlceras venosas; • Edemas linfáticos; • Erisipelas; • Eczema; • Dermatite crônica.
Contraindicação	Pessoa sensível aos componentes do produto.
Frequência de troca	Dependendo do estado da ferida, período máximo de troca de 7 dias, cobertura secundária de 12/12h ou conforme saturação.

GAZE NÃO ADERENTE COM AGE

Tabela 8: Gaze não aderente com AGE

Ação	Proteção e hidratação de feridas, não adere ao leito, previne traumas, estimula a cicatrização, é recortável.
Indicação	Lesões com necessidade de evitar aderência do curativo ao leito da ferida, resultando numa troca sem dor e com proteção do tecido viável, podendo ser usada como curativo primário.
Contraindicação	Feridas com secreção purulenta, com muito exsudato, feridas fechadas e feridas oncológicas devido em sua composição estar presente o ácido graxos essenciais que estimula a angiogênese.
Frequência de troca	• Podendo permanecer até 72h; • Curativo secundário a cada 12/12h ou conforme saturação.

SOLUÇÃO POLIMÉRICA - PELÍCULA PROTETORA DE PELE SPRAY

Tabela 9: Solução polimérica - película protetora de pele spray

Ação	Forma uma película protetora indolor, transparente e durável, resistente à água e permeável ao ar, permitindo transpiração da pele.
Indicação	• Áreas lesionadas por incontinência urinária e/ou fecal; • Lesões por fluidos digestivos (estomas); • Áreas lesionadas por exsudato de feridas; • Lesões por remoção de adesivos; • Áreas de fricção e cisalhamento na pele; • Prevenção de lesões por pressão e dermatites;
Contraindicação	Alergias aos componentes e uso diretamente na lesão.
Frequência de troca	• 12/12h em áreas de manipulações com higiene e troca de curativos; • Em áreas de prevenção de LP associado ao filme transparente permanece a ação em até 72h.

ADESIVO DE SILICONE COMPOSTO COM ESPUMA

Tabela 10: Adesivo de silicone composto com espuma

Ação	Absorve o exsudado e mantém um ambiente úmido na ferida, impedindo a fuga do exsudato para cima da pele circundante, minimizando assim o risco de maceração. Protege e proporciona remoção atraumática e indolor. Altamente adaptável ao contorno anatômico do corpo humano.
Indicação	• Feridas exsudativas crônicas e agudas; • Tratamentos e prevenções de Lesões por Pressão; • Lesões bolhosas; • Feridas traumáticas; • Úlceras venosas e arteriais.
Contraindicação	Ferida com tecido desvitalizado ou necrótico, feridas colonizadas ou que apresentam infecções críticas.
Frequência de troca	Até 7 dias sob avaliação profissional.

PAPAÍNA GEL 10%

Tabela 11: Papaína gel 10%

Ação	Provoca o debridamento químico conservador, pois é formulado a base de gel. Possui a propriedade de não prejudicar o tecido sadio que circunda a lesão. Age como potente desbridante de tecidos necrosados. Tem ações bacteriostáticas, bactericidas e acelera o processo de cicatrização. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo crescimento tecidual uniforme.
Indicação	• Feridas abertas com tecidos desvitalizados (que apresentem esfacelo bem aderido ao leito e/ou necrose de coagulação); • Pacientes com muita sensibilidade a dor que não toleram debridamento instrumental.
Contraindicação	• Pele íntegra, ferida operatória fechada, feridas exsudativas e áreas de exposição de tendão e óssea. • Pacientes com sensibilidade ao produto.
Frequência de troca	• A cada 24h; • Necessita de trocar cobertura secundária de 12/12h ou conforme saturação

PAPAÍNA CREME 10%

Tabela 12: Papaína creme 10%

Ação	Provoca o debridamento químico. Tem ações bacteriostáticas, bactericidas e acelera o processo de cicatrização. Proporciona alinhamento das fibras de colágeno, promovendo crescimento tecidual uniforme
Indicação	• Feridas abertas e debridamento de tecidos desvitalizados (esfacelo e necrose de coagulação); • Para potencializar seu efeito realizar escarificação da lesão antes.
Contraindicação	• Pele íntegra e tecido de granulação; • Ferida operatória fechada; • Feridas exsudativas; • Feridas sangrantes; • Áreas de exposição de tendão e óssea; • Pacientes com sensibilidade ao produto.
Frequência de troca	• A cada 12h; • Necessita de trocar cobertura secundária a cada 6h conforme saturação
Observação	Conservar sempre no interior da geladeira.

COLAGENASE

Tabela 13: Colagenase

Ação	Atua como um debridante enzimático indicado em feridas necróticas.
Indicação	- Feridas com tecido desvitalizado bem aderido ao leito, como esfacelos ou necroses; - Importante aplicar a técnica de escarificação para garantir a penetração eficaz da colagenase, permitindo que a enzima alcance o interior das crostas de tecido desvitalizado; - Para a ativação da colagenase é necessário a umidificação das gazes com solução fisiológica.
Contraindicação	- Feridas isquêmicas pois a quebra de colágeno por ela pode não ser eficaz em ambientes com falta de suprimento sanguíneo; - O uso inadequado da colagenase nesse contexto pode agravar a situação, comprometendo ainda mais a cicatrização; - Não usar em feridas sangrantes, colagenase não promove hemostasia.
Frequência de troca	- A cada 12/12h, podendo permanecer até 24hs sob avaliação profissional; - Não utilizar por período maior que 2 semanas

SULFADIAZINA DE PRATA

Tabela 14: Sulfadiazina de prata

Ação	Atua contra uma grande variedade de microrganismo, como: bactérias gram negativas e positivas, fungos, vírus e protozoários. Resultando em bactericida e bacteriostático;
Indicação	- Feridas infectadas com presença de sinais ativos de infecção: secreção purulenta e odor. - Feridas que necessitam da ação antibacteriana;
Contraindicação	Presença de hipersensibilidade aos componentes, disfunção hepática ou renal, gestantes, crianças menores de 2 meses de idade. O uso indiscriminado da sulfadiazina de prata causa intoxicação das células levando a destruição celular, o que pode resultar em resistência microbiana.
Frequência de troca	- No máximo a cada 12h ou quando a cobertura secundaria apresentar saturação; - No momento da troca a pomada pode apresentar aspecto purulento devido a oxidação; - Não utilizar por período maior que 2 semanas.

SULFATO DE NEOMICINA

Tabela 15: Sulfato de neomicina

Ação	A terapia antimicrobiana tópica permite um melhor controle da colonização microbiana, reduzindo a formação de crostas, as quais facilitam a manutenção da infecção, prevenindo, assim, o desenvolvimento de infecções mais graves.
Indicação	A neomicina é destinado ao tratamento de infecções da pele causadas por bactérias gram-positivas, e particularmente contra as gram-negativa, como: eczemas infectados, piodermites, furúnculos, abscessos e úlceras cutâneas.
Contraindicação	• Não deve ser usado nos casos de hipersensibilidade à neomicina, durante a gravidez ou a amamentação; • Não deve ser utilizado em bebês prematuros e em recém-nascidos (até os 28 dias de vida).
Frequência de troca	• A cada 24h; • Necessita de trocar cobertura secundária de 12/12h ou conforme saturação; • Não utilizar por período maior que 2 semanas.

MUPIROCINA

Tabela 16: Mupirocina

Ação	Possui propriedade bacteriostática em concentrações inibitórias mínimas e propriedades bactericidas nas concentrações mais elevadas que são alcançadas quando aplicada localmente.
Indicação	Indicação para tratamento de infecções bacterianas de pele, podendo ser utilizado em curativos oclusivos ou não oclusivos.
Contraindicação	Não existindo nenhuma contraindicação relativas a faixas etárias.
Frequência de troca	Deve ser aplicada na área afetada até três vezes ao dia e por no máximo dez dias.
Observação	Necessária prescrição médica.

ÁCIDO CAPRÍLICO

Tabela 17: Ácido caprílico

Ação	Protege a ferida preservando o tecido vitalizado e mantendo meio úmido proporcionando nutrição celular local. Acelera o processo de granulação tecidual. Evita a aderência ao leito da lesão e em lesões exsudativas atua como proteção de borda da lesão.
Indicação	• Tratar feridas abertas vitalizadas (tecidos saudáveis), não infectadas, em fases de granulação e epitelização (com ou sem exsudato); • Feridas que necessitam manter a hidratação.
Contraindicação	• Tecidos desvitalizados, hipergranulação, lesões infectadas, feridas oncológicas e áreas que permanecem abafadas e favorecem a umidade; • Feridas com cicatrização por primeira intenção e locais onde há necessidade de fixação de dispositivos.
Frequência de troca	• De 12/12horas; • Necessita de cobertura secundária; • Deve ser trocado toda vez que estiver saturada (molhadas, encharcadas), maceração de bordas, perda de umidade no leito da ferida.

CARVÃO ATIVADO COM PRATA

Tabela 18: Carvão ativado com prata

Ação	O carvão controla o odor através do mecanismo de absorção e a prata exerce ação bactericida.
Indicação	• Feridas exsudativas e infectadas, com ou sem odor; • Sua consistência permite a passagem do exsudato para a cobertura secundária.
Contraindicação	Hipersensibilidade a prata, presença de sangramento, feridas limpas e secas.
Frequência de troca	• As trocas ocorrem em média de 3 a 7 dias dependendo da capacidade de adsorção; • Necessita do uso de uma cobertura secundária com troca a cada 24 horas pois estimula a secreção nos primeiros dias de uso; • Sem manejo adequado da cobertura secundária o carvão ativado satura rapidamente.

METRONIDAZOL

Tabela 19: Metronidazol

Ação	Antibiótico utilizado no tratamento de infecções causadas por bactérias anaeróbicas e alguns protozoários.
Indicação	É extremamente útil no controle do odor de feridas tumorais, causada por germes anaeróbios.
Contraindicação	• Não deve ser usado nos casos de hipersensibilidade ao metronidazol, durante a gravidez ou a amamentação; • Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes pediátricos (abaixo de 12 anos).
Frequência de troca	• A cada 24h; • A cada 12h em lesões com muito odor.

CREME BARREIRA

Tabela 20: Creme barreira

Ação	Repele a entrada de líquidos, suaviza a pele, contendo protetor de pH que previne lesões cutâneas.
Indicação	• Pele seca irritada ou desidrata; • Áreas lesionadas por incontinência urinária e/ ou fecal; • Lesões por fluidos digestivos (estomas); • Áreas lesionadas por exsudato de feridas; • Lesões por remoção de adesivos; • Áreas de fricção e cisalhamento na pele; • Prevenção de lesões por pressão; • Dermatites.
Contraindicação	Alergias aos componentes e uso diretamente na lesão.
Frequência de troca	12/12h em áreas de manipulações com higiene e troca de curativos.

HIDROCOLÓIDE

Tabela 21: Hidrocolóide

Ação	Mantém o meio úmido, auxilia no desbridamento autolítico, reduz o risco de infecção, pois atua como barreira térmica, microbiana e mecânica. Reduz atrito, age como barreira protetora de área perilesional e para efluentes de estomas.
Indicação	Tratamento de feridas com mínimo exsudato, como úlceras de MMII (venosas, arteriais e mistas), úlceras diabéticas, proteção de proeminências ósseas.
Contraindicação	Feridas muito exsudativas, feridas infectadas, cavitárias, região sacra em caso de incontinência fecal e urinária e indivíduos sensíveis aos componentes do produto.
Frequência de troca	No máximo em 7 dias, sempre que apresentar saturação de cobertura ou o curativo descolar.

POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA – PHMB SOLUÇÃO

Tabela 22: Polihexanida solução aquosa – PHMB solução

Ação	Possui propriedades descontaminantes, acelerando o processo de cicatrização, quebra biofilmes e prepara o leito da ferida para receber o curativo.
Indicação	• Limpeza e hidratação de feridas crônicas e agudas; • Uso contínuo e diário, assepsia local e preventiva; • Não necessita ser enxaguado o leito da ferida para aplicação de coberturas; • É compatível com todas as coberturas.
Contraindicação	Compatível com a maioria dos curativos.
Frequência de troca	A cada troca de curativo.

REFERÊNCIAS

- CONSULTA REMÉDIOS. **Bula do Mupirocina.** Disponível em: <<https://consultaremedios.com.br/mupirocina/bula>>. Acesso em: 12 jan. 2024.
- CONSULTA REMÉDIOS. **Bula do Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica.** Disponível em: <<https://consultaremedios.com.br/sulfato-de-neomicina-bacitracina-zincica/bula#>>. Acesso em: 12 jan. 2024.
- CURATEC. **Curatec Curativo de Carvão Ativado com Prata.** Disponível em: <<https://www.curatec.com.br/curatec-carvao-ativado-prata>>. Acesso em 09 jul. 2024.
- CURATEC. **Curatec Compressa com Emulsão de Petrolatum.** Disponível em: <<https://www.curatec.com.br/curatec-compressa-emulsaopetrolatum>>. Acesso em: 08 jul. 2024.
- EBSERH. **Materiais padronizados para o tratamento de feridas: manual de consulta rápida.** Isabel Cristina Alves Maliska, Maria Terezinha Honório, (organizadores). Florianópolis: Grupo Interdisciplinar de Cuidados com a Pele, HU/UFSC, 2020.103 p.: il. (Segunda revisão).
- EUROFARMA. **Trok N® (cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de neomicina) Bula para paciente Pomada 20 mg/g + 0,64 mg/g + 2,5 mg/g.** Disponível em: <<https://eurofarma.com.br/produtos/bulas/patient/pt/bula-trok-n-2.pdf>>. Acesso em: 09 jul. 2024.
- FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. Vigilância em Saúde. **Protocolo de cuidados de feridas / Coordenado por Antônio Anselmo Granzotto de Campos;** Florianópolis: IOESC, 2007.

- HERTZ FARMA. **Bactoderm**. Disponível em: < <https://www.hertzfarma.com.br/produto/bactoderm/> >. Acesso em: 09 jul. 2024
- HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE. **Avaliação e Tratamento de Feridas Orientações aos Profissionais de Saúde**. Disponível em: < <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/34755/000790228.pdf?sequence=1&isAllowed=y> >. Acesso em 15 jun. 2023.
- MATERIAL MÉDICO. **Filme Transparente Kangli Film Rolo – Vitamedical**. Disponível em: <<https://www.materialmedico.com.br/filme-transparente-kangli-film-rolo-vitamedical> >. Acesso em: 08 jul. 2024.
- MAXIMEDSUL. **Curativo Espuma Superabsorvente com silicone Cutimed Siltec B Tamanho 15cmx15cm UNIDADE - Cod: 7328402**. Disponível em: <<https://loja.maximedsul.com.br/produtos/curativo-espuma-superabsorvente-com-silicone-cutimed-siltec-b-tamanho-15cmx15cm-unidade-cod-7328402/> >. Acesso em 09 jul. 2024.
- ORTOPONTO. **O que é o curativo Bota de Unna e como utilizá-lo corretamente?**. Disponível em: <<https://www.ortoponto.com.br/m/blog/62cc1e9aeecee0436d73c9c7/o-que-e-o-curativo-bota-de-unna-e-como-utiliza-lo-corretamente> >. Acesso em: 08 jul. 2024.
- PHARMACIA ANTIGA. **GEL COM PAPAÍNA 10% - 100g**. Disponível em: <<https://www.pharmaciaantiga.com/saude-e-bem-estar/escaras/gel-com-papaina-10> >. Acesso em: 09 jul. 2024
- PRATI-DONADUZZI. **Metronidazol Nistatina Creme 100 mg/g + 20.000 UI/g**. Disponível em: < https://www.pratidonaduzzi.com.br/produtos/genericos?task=download&file=bula_medicamento&id=142 >. Acesso em: 09 jul. 2024.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - 2021. **Manual de Curativos**. Disponível em: < https://saude.campinas.sp.gov.br/enfermagem/Manual_Curativos.pdf >. Acesso em: 29 dez. 2023.
- RODRIGUES, T. S; et al. **Eficácia do curativo hidrocolóide em relação ao filme transparente na prevenção de lesões por pressão**. 2018. Disponível em: < <https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Efic%C3%A1cia-do-curativo-hidrocol%C3%B3ide-em-rela%C3%A7%C3%A3o-ao-filme-transparente-na-preven%C3%A7%C3%A3o-de-les%C3%B5es-por-press%C3%A3o.pdf> >. Acesso em: 04 jan. 2024.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE PRUDENTE. **Protocolo de Prevenção e Tratamento de Feridas**. Março 2018 – 2ª versão.
- SOUSA M.C.A., FRANCO R.O.M., OLIVEIRA P.S.C., SOUZA E.P.R. **Úlcera crônica tratada com gel de papaína 10% na Estratégia Saúde da Família: relato de experiência**. Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade. 2017; 12(39): 1-8. Disponível em: < https://www.researchgate.net/publication/314162079_Ulcera_cronica_tratada_com_gel_de_papaina_10_na_Estrategia_Saude_da_Familia_relato_de_experiencia >. Acesso em: 27 dez. 2023.
- VITAE SAÚDE. **Curativo DBS Pielisana Gaze de Rayon Embebida Óleo AGE**. Disponível em: <<https://www.vitaesaude.com.br/curativo-dbs-pielisana-gaze-de-rayon-embebida-oleo-age> >. Acesso em: 08 jul. 2024.

HISTÓRICO DE REVISÕES		
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0.0	05/09/2024	Emissão inicial
ELABORAÇÃO		APROVAÇÃO
Data: 09/07/2024 Joseane Ferreira de Sousa Saconi Coren-MS 243503 – ENF Enfermeira SCP		Data: 05/09/2024 Ana Carulina Guimaraes Belchior CRM 7605-MS Diretora DE PQI (interina) 05/09/2024 - fl. 39.
		Data: 15/07/2024 Mario Massahide Goto Junior Matrícula 126625021 Chefe do Setor de Normalização 09/07/2024

PROTOCOLO
PTC.DEPQI-SCP.002
COBERTURAS PARA CURATIVOS

Janaine Julie Magalhães Pinheiro Menezes Coren-MS 408914 – ENF. Enfermeira SCP	Luis Carlos de Oliveira Júnior Coren-MS 356.086 – ENF Gerente GCIH 15/08/2024 – fl. 24.	Patricia Rubini CRM 2820–MS Diretora DTEC 28/08/2024– fl. 38. Cristiane Costa Schossler Coren–MS 218991–ENF Diretora DCE 05/09/2024 – fl. 52.
---	--	--

* As verificações e aprovações foram realizadas exclusivamente via e-MS (NUP: 27.024.968-2024).

** O versionamento do componente Z (X.Y.Z), não demanda nova aprovação e não altera a próxima revisão.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte.