



### ANTIMICROBIANOS REALIZADOS NA OPAT E ADEQUAÇÕES POSOLÓGICAS

ANTIMICROBIANOS	DOSE E POSOLOGIA PARA FUNÇÃO RENAL E HEPÁTICAS NORMAIS
AMICACINA	15MG/KG UMA VEZ AO DIA
GENTAMICINA	5MG/KG UMA VEZ AO DIA
CEFEPIMA	2G DUAS VEZES AO DIA
CEFTAROLINA	600MG 2 VEZES AO DIA
CEFTAZIDIMA	2G DUAS VEZES AO DIA
CEFTRIAXONA	2G DUAS VEZES AO DIA
ERTAPENEM	1G UMA VEZ AO DIA
MEROPENEM	2G DUAS VEZES AO DIA
VANCOMICINA	15MG/KG DUAS VEZES AO DIA
TEICOPLAMINA	6MG/KG UMA VEZ AO DIA
DAPTOMICINA	4 A 6 MG/KG UMA VEZ AO DIA
LINEZOLIDA	600MG DUAS VEZES AO DIA
TIGECICLINA	50MG DUAS VEZES AO DIA
PIPERACILINA TAZOBACTAN	4,5 G TRÊS VEZES AO DIA
ANIDULAFUNGINA	100MG UMA VEZ AO DIA
CASPOFUNGINA	50MG UMA VEZ AO DIA
MICAFUNGINA	100MG UMA VEZ AO DIA
VORICONAZOL	3 A 4 MG/KG DUAS VEZES AO DIA
ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO	5MG/KG UMA VEZ AO DIA
ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL	3 A 5 MG/KG UMA VEZ AO DIA

FONTE: DIRETRIZES BRASILEIRAS OPAT

**NOTA: PARA ANTIMICROBIANOS QUE NÃO ESTÃO NA LISTA ENTRAR EM CONTATO RAMAL 2579**